



PREVALENCIA DE ESQUIZOFRENIA EN UN HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE VERACRUZ

Itzel Cabrera Lopez¹, Cesar Nazin Kuri García², Olga Lidia Valenzuela Limon³ y Emma Virginia Herrera Huerta³

1 Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Químicas, 2 Hospital de salud mental "Víctor Manuel Concha Vázquez", 3 Facultad de Ciencias Químicas (campus Orizaba). itzelcabrera03@outlook.es

Introducción: La esquizofrenia es una enfermedad psicótica, crónica, que puede causar cambios importantes en la percepción de la realidad de la persona. La incidencia en la población general es del 1%, afectando a más de 21 millones de personas en todo el mundo, es más frecuente en hombres (12 millones) que en mujeres (9 millones), comenzando con el padecimiento antes de los 25 años.

Objetivo: Determinar la prevalencia de los subtipos de esquizofrenia en pacientes internos adscritos a un Hospital de Salud Mental de Veracruz.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en pacientes internos durante el periodo Enero 2014-Diciembre 2016, mediante la revisión de los expedientes clínicos, los criterios de inclusión fueron pacientes adscritos al Hospital de Salud Mental con esquizofrenia. Se realizó una estadística descriptiva de las variables del estudio utilizando el programa Stata versión 13.

Resultados: En el presente estudio se encontraron un total de 16 subtipos de esquizofrenia, en 265 pacientes, de los cuales 45.15% presentan esquizofrenia paranoide, 32.71% esquizofrenia, 10.9% trastorno psicótico agudo y transitorio, 3.42% trastorno esquizotípico tipo maniaco, siendo estas patologías las más prevalentes. Se observó que la edad de aparición es entre los 15 y 25 años siendo el género masculino el de mayor prevalencia (54.72%).

Conclusión: La esquizofrenia es una enfermedad mental con mayor prevalencia en la población masculina, afectando principalmente a adolescentes y adultos jóvenes por lo que es importante identificar a temprana edad los factores de riesgo, para poder brindarle un tratamiento oportuno, facilitar la prevención o, el retardo de la aparición de la psicosis en los pacientes esquizofrénicos.