



## **PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES DIABETICOS CEAPS ALMOLOYA DEL RIO MEX.**

Mariluz Díaz Guzmán <sup>1</sup>, Miguel Angel Padilla Millán <sup>1</sup>, Mariluz Padilla Díaz<sup>2</sup>, Laura Ma. Díaz Guzmán <sup>2</sup>, Fernando Gasca Pliego <sup>1</sup> y Jorge Enrique Padilla Diaz<sup>3</sup>

1 Universidad Autónoma del Estado de México, 2 Universidad de la Salle Bajío, A. C., 3 Instituto Universitario del Estado de Mexico . mariluzdiaz@hotmail.com

### **Introducción.**

La enfermedad periodontal es una de las patologías de mayor incidencia en la población además de ser una de las causantes de pérdida dental, se considera un factor de riesgo para algunas enfermedades sistémicas. Las manifestaciones orales del paciente diabético dependen del control y del tiempo de la enfermedad.

### **Objetivo**

Determinar la Prevalencia de la Enfermedad Periodontal en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que acuden a consulta odontológica al CEAPS de Almoloya del Rio Méx. durante abril - noviembre 2015

### **Materiales y Métodos.**

Estudio Observacional, Descriptivo Transversal. Universo de 680 pacientes que acudieron a consulta odontológica. Se conformó una muestra de 250 pacientes con Diabetes tipo 2. Criterios de Inclusión pacientes que aceptaron formar parte del estudio firmando un consentimiento informado, paciente diabéticos mayores de 30 años. Procedimiento a cada paciente se le hizo historia clínica, se revisó su cavidad oral por cuadrantes. De la encía se vio su color, consistencia, dolor, cálculo dentario, bolsas periodontales, movilidad dental, Se aplicó el Índice Periodontal Russel .

### **Resultados**

Se revisaron 147 pacientes femeninas y 103 masculinos. La Periodontitis Crónica Severa fue la más frecuente con el 51.2%, seguida de la Periodontitis Crónica Moderada con el 23.2%. La Gingivitis ocupó el 12%. La Periodontitis Crónica leve alcanzó el 9.5%- El 14.4% fueron pacientes controlados con vigilancia médica y el 85.5% fueron no controlados. Otras alteraciones bucales fueron la Halitosis cetónica 25,4%. Xerostomía 15.4%. Disgeusia 11.1%. Lengua Fisurada 8-7%. Ulcera Traumática 5.8%.

### **Conclusiones**

La Prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo2 fue del 100%