



ULECTOMIA EN PACIENTE DE 9 AÑOS (Reporte de caso)

Monserrat Macías Ponce¹, Martha Graciela Fuentes Lerma², José Guadalupe Fernández Carranza¹, Martha Alicia González Palacios³ y Rocío Patricia Mariaud Schmidt⁴

1 Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara, 2 Instituto de Investigación en Odontología, 3 Instituto de Investigación en odontología, Universidad de Guadalajara, 4 Instituto de Investigación en Odontología. monce_mp@hotmail.com

INTRODUCCIÓN En este reporte se describe la técnica de la ulectomía en pacientes con erupción dental retardada debido a fibrosis de la mucosa gingival. **OBJETIVO** Reportar caso clínico de paciente masculino de 9 años de edad con ausencia de los órganos dentarios 11 y 21. **MAT.Y MÉT.** Paciente masculino, de 9 años y 2 meses de edad, acude a la Clínica de Odontopediatría de U de G, el motivo de la consulta no le erupcionan los OD 11 y 21, la madre refiere la pérdida prematura del 51 y 61 a los 4 años de edad por caries dental. En la rx, no se observa ninguna patología que pueda estar impidiendo la erupción dental; no existe tejido óseo recubriendo la corona dental, el 11 y 21 se observan 1.5 mm por encima de la mucosa, dx ulectomía para facilitar la erupción del 11 y 21. Una vez firmada la carta de consentimiento, se procede la antisepsia, anestesia tópica e infiltrativa de las ramas terminales del nervio alveolar superior. Enseguida se realiza la incisión con bisturí y hoja nº15, en forma de ojal, se remueve tejido gingival que recubría el diente 2 mm por arriba del borde incisal en sentido mesio-distal. Se retira el tejido y se procede a realizar la irrigación con suero fisiológico y la hemostasia tamponando con gasa esterilizada. Se le dan las instrucciones post-operatorias de rutina y se entregan al responsable. Después de 7 días el control clínico post operatorio fue favorable, a los 3 meses se encuentran en su posición. **CONCLUSIONES** La fibrosis de la mucosa gingival es una alteración causada por la fricción superficial de los alimentos con la mucosa del espacio edéntulo durante la masticación, cuando el diente temporal es perdido precozmente, ocurre más en la región de los incisivos centrales superiores.