



Determinar la eficacia de la palpación en zona torácico y lumbopélvica

CLAUDIA LETICIA RODRIGUEZ TORRES¹, Maria Elizabeth Herrera López¹, Enrique Montiel Flores¹, Rene Domínguez Rubio¹ y Juan Jose Saldaña Mena¹

1 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC. quiropacticojuanjo@hotmail.com

Determinar la eficacia de la palpación en zona torácica y lumbo-pélvica La palpación es un método utilizado en diferentes áreas de la salud así como en las terapias manipulativas siendo esencial para el manejo y atención de la disfunción articular; recientes estudios revelan una limitante al explorar a través de técnicas palpatorias del segmento o zona anatómica siendo de gran relevancia ya que una de las herramientas más importantes en la técnicas manipulativas es la precisión de la palpación, para generar un diagnóstico que determinará la meta terapéutica. Estas limitantes pueden ser las características del tejido circundante como adipocitos, anomalías en estructuras anatómicas de origen genético; y por otra parte las del terapeuta como es la falta de experiencia y conocimiento anatómico entre otros. Por lo que este grupo de investigación desea saber el margen de error cometido en el diagnóstico nosológico por los especialistas en quiropráctica al compararlo con las marcaciones radiológicas