



Supernumerario en dentición temporal y agenesia en dentición permanente en niña de 4 años de edad. Reporte de un caso.

Introducción

Los dientes supernumerarios se caracterizan por un exceso en el número de dientes presentantes en un individuo, dicha anomalía puede presentarse en ambas denticiones con morfología normal o dismórfica, los cuales puede estar incluidos o erupcionados de manera normal y/o en mal posición. Existen varias teorías que pretenden explicar la aparición de la hiperodoncia como también se le conoce, la más aceptada es la asociada a la hiperactividad de la lámina dental. La presencia de dientes supernumerarios en dentición decidua es cinco veces menos común que en la dentición permanente.

La agenesia dentaria es una anomalía del desarrollo cráneo facial que se presenta de manera común. Teniendo un factor etiológico en su mayoría genético asociado a una alteración en una proteína necesaria en las etapas de iniciación o morfogénesis temprana puede producir una agenesia. La ausencia de una sola pieza dental se le denomina hipodoncia.

Ambas alteraciones del desarrollo son de los factores más comúnmente provocan maloclusiones.

Método

Paciente femenina de 4 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia para el caso, acude a revisión a la consulta particular. Paciente cooperadora con respuesta favorable a técnicas de manejo sencillas. Sin presencia de hábitos. A la exploración clínica observamos la existencia de un diente supernumerario con anatomía de canino al lado del canino superior derecho, posicionado de manera alineada dentro de la arcada invadiendo los espacios de primate al revisar la oclusión se observa una mordida abierta en la zona del lateral canino y supernumerario del mismo lado. Se realizó una radiografía periapical donde se analizó la anatomía y longitud de las raíces con similitud a un canino. Se solicitó una ortopantomografía para descartar la presencia de más dientes supernumerarios, en la que no se observó presencia de dientes supernumerarios en la dentición permanente, pero sí se observó la agenesia del órgano dentario 35.

Resultados

El plan de tratamiento será dar seguimiento y cuando erupcione el primer molar permanente realizar la extracción de supernumerario para evitar maloclusiones. Para el órgano dentario que no tiene sucesor se le darán los cuidados preventivos para prolongarle la vida dentro de la boca el mayor tiempo posible.

Conclusión

Las revisiones a edades tempranas permiten el diagnóstico oportuno de alteraciones y así dar tratamiento para evitar maloclusiones u otro tipo de alteraciones en la dentición permanente.

Por otro lado, es extremadamente raro encontrar dientes supernumerarios en dentición primaria registrando un porcentaje entre 0.2 y 2%. En cuanto a la agenesia la prevalencia alcanza el 20% en dentición permanente.