



PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN CIRUJANOS DENTISTAS DEL IMSS ESTADO DE MEXICO DELEGACION 16

MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN¹, YUVIDIA ARIZMENDI ROGEL¹, MARILUZ DIAZ GUZMAN¹, MARILUZ PADILLA DIAZ² y LAURA MARIA DIAZ GUZMAN²

1 Universidad Autónoma del Estado de México, 2 Universidad de la Salle Bajío, A. C.. padillamillan@hotmail.com

Introducción. El Cirujano Dentista labora profesionalmente con ciertas características que lo hacen vulnerable a diversas afecciones físicas, psicológicas por el contacto con el paciente, las horas de trabajo y la exposición directa con infecciones que lo hacen asequible a enfermedades que afectan con el tiempo su salud.

Objetivo. Determinar las prevalencia de enfermedades profesionales derivadas de la práctica odontológica en cirujanos dentistas de la Delegación 16 poniente del IMSS Estado de México durante el periodo Julio - Noviembre 2012

Materiales y Métodos. Investigación Observacional Transversal y Descriptiva. Universo de 94 cirujanos dentistas que laboran en las Unidades de Medicina de la Delegación 16 Poniente IMSS. Muestra de 63 trabajadores basificados con categoría estomatológica. Criterios de Inclusión Profesionistas con antigüedad de 5 años laborales en el IMSS. Cirujanos Dentistas que aceptaron formar parte del trabajo firmando un consentimiento informado bioético. Se les aplicó un cuestionario.

Resultados Se Estudiaron 43 profesionistas femeninas y 20 masculinos con antigüedad laboral de 5 a 28 años Dos terceras partes tienen consultorio particular. Las áreas de trabajo no se consideran ergonómicas en el 57% Una tercera parte de la muestra fuma y consume alcohol regularmente. Se presentaron las siguientes enfermedades profesionales Tendinitis 96%. Dolor de espalda 95%. Parestesia de brazos 92% Cifosis 79.4%. Dermatitis de contacto 49.2%. Conjuntivitis 63.5%. Sordera 44.4%. Hepatitis 12.7%. Hipertensión Arterial 22%. Para comparación de datos se usaron las pruebas de Chi - cuadrada

Conclusiones La prevalencia de enfermedades profesionales alcanzó el 96% siendo la Tendinitis y el dolor de espalda las lesiones más prevalentes