



ENDOMETRIOSIS, FACTOR DE RIESGO ASOCIADO A CÁNCER EPITELIAL DE OVARIO

LORENA TÉLLEZ AZTORGA¹, FLAVIA MORALEZ VÁSQUEZ², ANAI ORTEGA ESPINOZA¹, MARÍA JOSÉ GOMORA HERRERA¹, ARELI MAGDALENA BECERRA¹, MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ HERRERA¹ y SUSANA L. MENDOZA BRIONES¹

1 Facultad de Medicina, UNAM, 2 Instituto Nacional Cancerología . lorena_tellez_aztorga@yahoo.com.mx

El cáncer epitelial de ovario (CEO) es mundialmente la séptima causa de muerte en mujeres¹. En México es la segunda neoplasia ginecológica más letal, debido al diagnóstico en etapas avanzadas y la alta frecuencia de recaídas resistentes a quimioterapia. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la asociación de la endometriosis con el CEO. Ésta, se define como: "tejido endometrioide implantado fuera de la cavidad uterina" y es común en mujeres en edad reproductiva². Hay datos que muestran una asociación de la endometriosis patológica con el riesgo de desarrollar carcinomas ováricos del subtipo de células claras (39.2%) y endometrioides (21.2%)³. Pacientes con endometriosis de larga evolución, diagnosticada en edades tempranas, asociada a infertilidad o endometriomas ováricos tienen mayor riesgo de neoplasias. Es importante identificar y dar seguimiento a éstas pacientes con la finalidad de diagnosticar CEO en estadios tempranos y mejorar la sobrevivencia de estas mujeres⁴. Agradecimientos PAPIIT-IN224116, INCan-080340MI

Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Disponible en: <http://globocan.iarc.fr>, revisado el 16/03/2016. Krawczyk N, et al. Endometriosis-associated Malignancy. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2016;76(2):176-181. Heidemann LN, et al. The relation between endometriosis and ovarian cancer a review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014; 93(1):20-31. Nezhat FR et al. The link between endometriosis and ovarian cancer: clinical implications. Int J Gynecol Cancer. 2014;(4):623-8