



MANEJO DE HIGIENE ORAL EN PACIENTES ESPECIALES

Angelica Ixchel Hernandez Gonzalez¹, Ana Paola Jurado Vazquez² y Gerardo Enrique Garcia Castillo¹

1 UMAG , 2 UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL GOLFO . atracalexandre@gmail.com

La Salud Oral deficiente en personas con Discapacidad se asocia a falta de cuidados en higiene que pueden derivar de dos factores principales, el primero la falta de cuidado y manejo del cuidador, y la segunda la incapacidad física, mental o motriz del individuo. El presente estudio realizara un análisis de esas dos variables y adaptara para crear un protocolo de manejo Estomatológico de Prevención. Con respecto a los cepillos manuales estudiados, se ha encontrado que los cepillos de doble y triple cabeza mejoran su eficacia con ayuda de los padres. Cepillo sónico en personas incapaces de controlar sus brazos y manos. En pacientes con retraso mental, el cepillo eléctrico Braun 3D de Oral-B® es el más eficaz para la remoción de placa. La clorhexidina de uso con 2 sprays al día y la clorhexidina al 0,12% en gel, ha demostrado ser de gran ayuda en la disminución de placa dentobacteriana y sangrado gingival, aunque en esta presentación se relaciona con efectos secundarios como pigmentaciones CONCLUSION: La prevención de enfermedades orales a pacientes especiales en cuanto a capacidad funcional y actividad, define como restricción o ausencia para realizar una actividad normal. Observamos que la higiene con el cepillo sónico es significativamente superior, ya que reduce de placa el 68% en pacientes con retraso mental, y el cepillo eléctrico Braun 3D de Oral-B® es el más eficaz a corto plazo este dispositivo reduce de forma significativa los índices de inflamación gingival e índice de placa, en comparación con el cepillo común. La clorhexidina en todas sus presentaciones en diferentes concentraciones ha sido comparada con otros agentes para el control químico de placa, encontrando que es más efectiva que el fluoruro cuando se usan 2 sprays al día.