



DEPRESIÓN Y MORBILIDAD LEVE: BSI MUESTRA DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES NACIONALES UBICADOS EN LA CDMX

Ma. del Rosario Silva Arciniega¹

1 Escuela Nacional de Trabajo Social. rsilva@unam.mx

El objetivo del estudio fue conocer si existe diferencia estadísticamente significativa entre el total de la calificación del BSI aplicado en una muestra de migrantes y no migrantes mexicanos ubicados en la CDMX MÉTODO Estudio factorial, comparativo, de campo y transversal. Variables: Independiente Migración; Dependiente Inventario de Síntomas (BSI). Definición conceptual: Migración Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. BSI Instrumento de autoinforme desarrollado por Leonard Derogatis y asociados (1983) para evaluar el grado de malestar psicológico. Definición operacional Migración se midió a partir de la calidad de persona Migrante o no Migrante nacional. Dimensiones del BSI (1983) 1) Somatización, 2) Obsesión-compulsión, 3) Sensibilidad interpersonal, 4) Depresión, 5) Ansiedad, 6) Hostilidad, 7) Ansiedad Fóbica, 8) Ideación paranoide y 9) Psicoticismo. Instrumento BSI escala de Tipo Likert con cinco opciones de respuesta y 46 asertos. Muestra estuvo conformada por 500 personas 250 migrantes y 250 no migrantes mexicanos ubicados en la CDMX. Estadística empleo de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, puntaje Z, tablas de contingencia, χ^2 , análisis factorial de tipo Alpha con rotación varimax, alpha de Cronbach. RESULTADOS Se obtuvieron once factores propios con valor eigen superior a 1.000, varianza acumulada de 58.868; KMO 0.912 y confiabilidad de 0.932 para 46 asertos; que fueron denominados: 1) Depresión, 2) Agorafobia, 3) Somatización, 4) Paranoia, 5) Hostilidad, 6) Miedo, 7) Ansiedad, 8) Sensitividad Interpersonal, 9) Ideación Paranoide, 10) Dependencia Emocional y 11) Angustia. El factor uno fue denominado Depresión cuenta con una varianza explicada de 26.559, y una confiabilidad de 0.851; su primer reactivo tiene una carga factorial de 0.737, y es el que mejor refleja la forma en que se percibe la muestra y se refiere a Sentimientos de soledad. Calificación normativa del Inventario de Síntomas BSI Se obtuvo suma directa de puntuación del BSI por sujeto y se normalizaron las sumas calificando con los siguientes valores: 1) Menores a la media menos una desviación estándar = Sin morbilidad psiquiátrica. 2) La media más menos una desviación estándar = Morbilidad leve. 3) Mayores a la media más una desviación estándar se designó Patología psiquiátrica. Para la Población Migrante la frecuencia ubicada en la categoría Sin morbilidad psiquiátrica fue 9.20%, 23 personas, Con morbilidad leve 80.8%, 202 y Con patología psiquiátrica 10%, 25. La población No Migrante obtuvo Sin morbilidad psiquiátrica 9.20%, 23 personas, Con morbilidad leve 78% 195, y Con patología psiquiátrica 12.8% 32. Se aceptó la hipótesis nula que especifica la existencia de igualdad entre la muestra de migrantes y no migrantes mexicanos ubicados en la CDMX, con $p = 0.612$ significativa obtenida con χ^2 , lo que indica que se trata de una población que se encuentra en estado de morbilidad leve.