



PREVALENCIA DE HALITOSIS EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UAEMEX

MARILUZ DIAZ GUZMAN¹, MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN ¹, JESUS ANGEL CARMONA HERNANDEZ¹, FRANCISCO JAVIER JASSO RODRIGUEZ¹, MARILUZ PADILLA DIAZ² y ALFREDO ARROYO MALDONADO ¹

1 Facultad de Odontología, UAEM, 2 Universidad de la Salle Bajío, A. C.. mariluzdiaz@hotmail.com

La Halitosis, es un padecimiento común en el ser humano, causado por los compuestos volátiles sulfurosos emanados de la cavidad bucal e interior del cuerpo. Es alteración con etiología multifactorial. Se buscó determinar la prevalencia, etiología y clasificación de Halitosis en pacientes que acuden a la Facultad de Odontología en el periodo 2019B. Estudio observacional, descriptivo, transversal, muestra de 100 pacientes; seleccionados de manera aleatorio simple. Criterios de inclusión: Pacientes que aceptaron formar parte del estudio y firmaron consentimiento informado. Criterios de exclusión: Pacientes que no aceptaron formar parte del estudio. El diagnóstico de Halitosis se realizó por medio de una valoración organoléptica. Donde un examinador se colocó a 10cm de la cavidad bucal de cada paciente; calificando el grado de halitosis según la escala de Rosenberg, donde 0 es ausencia y 5 es halitosis grave, en la percepción del mal aliento. El 83% de los pacientes refirieron tener mal aliento por las mañanas. Se recolectó información con base a una historia clínica médico-dental y cuestionario que evaluó hábitos higiénicos y dietéticos, para determinar las causas locales y/o sistémicas que generan esta alteración. La prevalencia de Halitosis en pacientes que acuden a la Facultad de Odontología es del 82%. El 94% de los casos de Halitosis tienen origen en cavidad bucal. La Halitosis Patológica Extrabucal, con un porcentaje mínimo de 6%.

No están bajo tratamiento médico 5% de los pacientes que refieren tener alguna afección sistémica Mayor prevalencia de halitosis en el rango de edades de 46-55 años con 24%. En el 6% de los pacientes hay presencia de halitosis, aún teniendo buena higiene. La prevalencia de Halitosis en pacientes que acuden a la Facultad de Odontología en el periodo 2019 B es del 82%. El 94% de los casos de Halitosis tienen origen en cavidad bucal. La edad es un factor desencadenante ya que esta alteración se incrementa y agrava conforme la edad avanza