



## **REHABILITACIÓN: PRÓTESIS TOTAL EN ARCADA SUPERIOR Y PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE CON CORONA CON INDICACIÓN PROTÉSICA EN ARCADA INFERIOR, REPORTE DE UN CASO**

Saralyn López y Taylor<sup>1</sup>, Sabrina del Rosario Pérez Santana<sup>1</sup>, Luz Elena Nápoles Salas<sup>1</sup>, Ana Bertha Olmedo Sánchez<sup>1</sup>, Rosa Patricia Gómez Cobos<sup>1</sup>, Belinda Pérez Santana<sup>1</sup>, Olga Rocío Manzo Palomera<sup>1</sup> y Carolina Solorio González<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> Universidad de Guadalajara. slopeztaylor@hotmail.com

La realización de un tratamiento odontológico integral es fundamental hoy en día puesto que brinda un mejor resultado y pronóstico (1). En los casos donde se requieran tanto uno como el otro, el uso de ambas llevará a la recuperación completa del paciente (2). Además, en ciertas situaciones la realización de una corona con indicación protésica es necesaria para el soporte de prótesis parciales removibles, por lo tanto, la preparación de la pieza debe tener en cuenta la posición de todos los componentes y el eje de colocación de la prótesis parcial removible y al mismo tiempo seguir todos los parámetros asociados con la preparación dentaria propiamente dicha, adicionalmente, también se deberá evaluar el pronóstico del pilar y mantener la adaptación y sellado marginal de la corona, así como educar al paciente en la higiene para mantener el éxito de los tratamientos. (3,4). Se presenta Paciente femenino de 47 años de edad, motivo de la consulta "Quiero hacerme una nueva placa porque la que traigo se me rompió" Se realizó la extracción del órgano dentario #37, tomó la impresión para la elaboración de la cucharilla de modelina, se tomó la impresión final con silicón, se obtuvo el modelo de trabajo final, se elaboró el tallado del órgano dentario #34, se tomó la impresión final, se probó el metal de la cofia, se mandó al laboratorio a la aplicación de porcelana, se probó, se cemento, se preparó en boca los nichos para prótesis parcial removible inferior, se tomó la impresión final, se obtuvo el modelo definitivo para mandar al laboratorio y realizar la estructura de metal, obteniendo la estructura se probó y se ajustó, se realizaron bases y rodillo, se tomó relaciones maxilomandibulares, se montaron los dientes para seguir con la prueba de dientes en cera, se mandó al laboratorio para su terminación y así se entregaron las prótesis al, se realizaron los últimos ajustes y se le dieron las indicaciones para su mantenimiento. El Objetivo: Compartir la terapéutica elegida y llevada a cabo para restaurar protésicamente la función, estética y la fonética de una paciente de mediana edad. La restauración completa de la función, la fonética y la estética de la cavidad oral requiere de un tratamiento multidisciplinario e integral para lograr los mejores resultados posibles. En algunos casos es necesaria la combinación de diferentes tipos de prótesis como lo son la prótesis total, prótesis parcial removible y coronas con el objetivo de devolver la función total del paciente como en el caso antes presentado. Bibliografía 1 Winkler, S. Prostodoncia total. México: Instituto Politécnico Nacional, 2010. 2 Torres M, Quintana del Solar M, Castillo A. Adaptación de una corona metal cerámica como pilar de una prótesis parcial removible preexistente. Rev Estomatol Herediana, 2015 Oct- Dic;25(4);288-94 3 Carr A, McGivney G, Brown D y McCracken W. Prótesis Parcial Removible. 11 ed. Madrid; Elsevier; 2006 4 Burns DR & Unger JW. The construction of crowns for removable partial denture abutment teeth. Quintessence. Int. 1994; 25 (7):471-5